

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-2-7-71 196613

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 1 au Bulletin n° 130 du mois de Juillet 1971

1er Juillet 1971

VIGNE

ROT-BRENNER

Une attaque brutale de Rot-Brenner vient de se déclarer dans les vignobles en coteaux situés entre RODERN et BERGHEIM, ainsi que dans la région de BERGHOLTZ (68). Toutes les parcelles atteintes sont en exposition Nord ou Nord-Est. Le Rot-Brenner est également observé dans la région de DAMBACH-LA-VILLE, mais à un moindre degré.

Il est à craindre que la maladie apparaisse dans d'autres situations dans les jours à venir.

Cette maladie se manifeste sur le feuillage par l'apparition de taches jaunâtres qui se dessèchent rapidement. La feuille semble brûlée et tombe prématurément.

Des dessèchements sur grappes sont actuellement observés et dans certaines parcelles la récolte est sérieusement compromise.

Dans toutes les parcelles contaminées, un traitement cuprique ou éventuellement organo-cuprique devra être réalisé dans les meilleurs délais. Traiter avec beaucoup de soin.

MILDIOU

Bien que le Mildiou soit à peu près inexistant dans le vignoble jusqu'à ce jour, les précipitations fréquentes et les longues périodes d'humectation du feuillage, furent et restent favorables au développement de ce champignon.

Nous considérons qu'un nouveau traitement devrait être réalisé dès que possible.

En raison des risques d'extension du Rot-Brenner, il est vivement conseillé d'utiliser un produit cuprique ou un organo-cuprique.

GRANDES CULTURES

TABAC

MILDIOU

Les premiers foyers de Mildiou sont signalés depuis quelques jours, aussi bien dans le RIED que dans l'ACKERLAND-KOCHERSBERG. Nous invitons les planteurs à suivre strictement les indications de leur chef de secteur, tant en ce qui concerne l'application des traitements que la destruction des foyers existants.

En cette période de forte pluviométrie, la variété Paraguay devra être traitée régulièrement.

.../...

HOUBLON

MILDIU

De nouvelles manifestations de la maladie ont été observées ce jour. En raison de l'abaissement des températures, favorable à l'évolution du Mildiou et du stade critique des cultures (pré ou pleine floraison, selon les variétés), un nouveau traitement fongicide devra être réalisé avant le 6 Juillet.

PUCERONS

Les produits de contact utilisés par les houblonniers, ont permis d'enrayer les fortes attaques de Pucerons. Néanmoins, nous conseillons aux houblonniers de suivre avec attention l'évolution des nouvelles colonies qui pourront s'installer. En effet, les Pucerons ailés (fondatrices) sont encore très actifs.

En raison du stade végétatif actuel, les produits à action endotherapique (systémiques) sont à déconseiller. D'autre part, il est trop tard maintenant pour utiliser le Diméfox.

MAIS

PYRALE

Les premiers papillons ont été capturés en cage d'élevage dans la HARDT, à OBERNAI et à WISSEMBOURG. Un avis ultérieur précisera la période d'intervention contre la Pyrale.

CULTURES MARAICHÈRES

HARICOTS

PUCERONS

Les Pucerons noirs se développent dangereusement dans de nombreuses cultures de haricots. Traiter avec l'un des produits figurant sur la liste en votre possession.
Les délais d'emploi avant la récolte doivent dicter le choix du produit.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON et Ch. JANUS.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.

Dernière Note parue : Bulletin n° 130 du mois de Juillet 1971 publié le 1er Juillet 1971.